

月旬	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月					
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
生育区分	播種			育苗期間			移植			活着			有効分けつ期			無効分けつ期			幼穂形成期			登熟期		
水管理	播種によって頑丈な苗を育てる			活着をよくする 深水			浅水			中干し			根の張りをよくする 間断灌水			穂揃いをよくする やや深水			根の活力維持 間断灌水			早期落水をしな		
栽培管理の要点	○ 種子選別の徹底 ○ 塩水選・種子消毒 ○ 箱詰りの徹底 100〜1000粒(原種) (原種)			○ 箱詰り ○ 移植密度坪60株 ○ 除草剤処理			○ ガス抜き			○ 溝切りの実施 ○ 小干しの実施 ○ 出穂40日前 ケイ酸加里追肥 ○ 株当たり20本に なったら中干し開始			○ 間断灌水 ○ コシヒカリ ミルキークイーン 穂肥 葉色3.5~4.0 ○ 出穂後は深水 (注) (注)			○ 間断灌水			○ 早期落水をしな ○ 早期落水 (注) (注) (注) ○ 早期落水 (注) (注) (注)					
基肥+穂肥	10a/40kg上限																							
一発肥料	10a/40kg上限																							
農薬使用	エムホープロ (原種) (原種) (原種) (原種) (原種) (原種) (原種) (原種) (原種)			ブイホーガード ブイホーガード ブイホーガード			ヒエクリン (移植後15日) アトトリ (移植後14日)			スタークル剤 (穂孕み後期)														

適期刈取目安

- 積算温度 850~900℃
- 出穂後35日前後

